

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к договору № \_\_\_\_\_  
Об оказании стоматологических услуг с  
применением дентальных имплантатов

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Клиника обязуется провести стоматологическое лечение с применением дентальных имплантатов в соответствии с планом лечения, составленным врачом – хирургом (имплантологом) и врачом- ортопедом.

1.2. Стоматологическое лечение состоит из двух частей: хирургическая часть (установка внутрикостной части имплантатов) и ортопедическая часть (протезирование на имплантатах).

1.3. Оплата за стоматологическое лечение также состоит из двух частей: оплата за хирургическую часть (вживление имплантатов) и протезирование.

1.4 Оплата за хирургическую часть должна быть произведена в день подписания договора – 50% и оставшиеся 50% не менее чем за три дня до назначенного хирургического вмешательства.

1.5. Пациент обязуется следовать всем медицинским и административным рекомендациям, описанным в разделе «Рекомендации» данного приложения.

1.6. В случае неудачного исхода хирургической части (отторжение имплантата до завершения ортопедического лечения) Клиника предоставляет возможность повторной установки имплантатов за счет Клиники. Данные обязательства не действуют в случае несоблюдения Пациентом послеоперационных рекомендаций, нерегулярного гигиенического ухода курения.

1.7. Клиника дает годовую гарантию на ортопедическую конструкцию с опорой на дентальные имплантаты Miss (Израиль), три года Osstem (Юж Корея), Impro (Германия), пять лет Biotek (Франция) после окончания ее последнего этапа, при соблюдении рекомендаций, оговоренных в данном приложении.

1.8. Клиника устанавливает имплантаты фирм: Osstem (Юж Корея), Biotek (Франция), Miss (Израиль), Implantium (Корея), Impro (Германия) и др , сертифицированные в РФ .

1.9. Учитывая, что качество лечения и срок эксплуатации ортопедической конструкции зависит от соблюдения гигиены полости рта в домашних условиях и регулярности проведения профессиональных чисток полости рта в условиях Клиники, Пациент обязательно должен следовать рекомендациям врача.

1.10. Статистика интеграции имплантатов (приживления) составляет 96,0-99,0%.

### 2. РЕКОМЕНДАЦИИ

2.1. До начала лечения Пациент обязуется сдать клинические анализы по направлению врача-хирурга (имплантолога).

2.2. Клиника имеет право отказать Пациенту в проведении лечения в случае неудовлетворительных анализов, а также в случае отсутствия терапевтического контакта с врачом, необходимого для получения положительных результатов лечения.

2.3. Пациент обязуется принимать необходимые медикаменты (антибиотики и противовоспалительные) при назначении их врачом- хирургом Клиники и являться на осмотры в послеоперационный период, с целью предотвращения возникновения инфекции и развития осложнений.

2.4. Пациенту рекомендуется следить за своим здоровьем. В случае имеющихся у Пациента заболеваний, таких как сахарный диабет или остеопороз, заболевания щитовидной железы в декомпенсированной форме Пациент обязуется предупредить Клинику до начала лечения. В случае возникновения у Пациента данных заболеваний после проведенного стоматологического лечения с опорой на дентальные имплантаты, Клиника более не может давать гарантию на стоматологическое лечение с момента появления у Пациента данных заболеваний.

2.5. Клиника рекомендует систематический контроль после окончания стоматологического лечения с опорой на дентальные имплантаты в первом году 1 раз в три месяца, далее не реже, чем 1 раз в полгода (по назначению врача). Последующий профессиональный гигиенический уход должен осуществляться не реже чем 1 раз в полгода. При несоблюдении данного пункта рекомендаций гарантии на стоматологическое лечение аннулируются.

2.6. Пациенту рекомендуется соблюдать все рекомендации с целью сохранения гарантии на стоматологическое лечение, так как причинами отторжения имплантатов может быть: возникновение

инфекции, что является следствием несоблюдения послеоперационных рекомендаций, гигиены, а также курение.

2.7. Одной из причин отторжения имплантатов может быть некорректно проведенное протезирование с опорой на дентальные имплантаты. При проведении протезирования в Клинике, последняя гарантирует качество протезирования, а соответственно сохранение вышеперечисленных гарантий. При осуществлении протезирования с опорой на дентальные имплантаты специалистами других учреждений, гарантии, предоставляемые Клиникой на стоматологическое лечение, аннулируются.

2.8. При проведении какой-либо хирургической манипуляции с дентальными имплантатами (ранее установленными в Клинике) вне Клиники, гарантии аннулируются.

### **3. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

3.1. При болевых ощущениях примите рекомендованные врачом Клиники препараты.

3.2. При появлении отека обязательно поместите холодный компресс на кожу лица в области проведенных манипуляций в течении первых трех часов после операции. Компресс накладывайте на 20 минут с перерывами на 10-15 минут. Если возможно, повторяйте эту процедуру в течении всех трех часов после операции.

3.3. Не полощите рот в день операции. На следующий день, не менее 5-6 раз в день делайте ванночки с асептическим раствором (набрать раствор в рот и подержать) в течении минуты. Чистите оставшиеся зубы.

3.4. Во время заживления необходимо воздержаться от употребления твердой пищи. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пить через соломинку, сплевывать в течении 36 часов, наклоняться, поднимать тяжести, заниматься спортом, ходить в сауну, купаться в море, чихать, курить.

3.5. Кровотечение (выделение небольшого количества крови) считается нормальным. При появлении на языке крови ярко красного цвета, немедленно позвоните администратору Клиники.

3.6. Появление чувства напряженности в челюстях – нормальная реакция после операции.

3.7. Возможно появление на лице гематом.

3.8. Парестезия (потеря чувствительности в области операции) явление временное, которое, однако, может потребовать длительного периода восстановления.

3.9. Принимайте все предписанные медикаменты и являйтесь на осмотры.

3.10. При возникновении проблем или вопросов, пожалуйста, звоните по телефону 89184883800.

### **4. ЗУБНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ И КУРЕНИЕ**

4.1. Курение резко снижает успех стоматологического лечения с применением дентальных имплантатов по следующим причинам:

а) при курении в полости рта создается разреженное давление, что препятствует формированию кровяного сгустка, который является важным условием процесса заживления послеоперационной раны;

б) никотин способствует сужению сосудов, что замедляет кровообращение, ухудшая процесс заживления послеоперационной раны.

в) при вдыхании дыма возникает ожог слизистой оболочки полости рта

4.2. Пациент обязуется проинформировать Клинику о том, что он курит, до начала стоматологического лечения с применением дентальных имплантатов.

4.3. На основании литературных данных и клинического опыта курение резко снижает успех стоматологического лечения с опорой на дентальные имплантаты, поэтому в случае курения Пациента, Клиника не может нести ответственность по гарантийным обязательствам.

\_\_\_\_\_  
Дата

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.